



SCHEDA CARTACEA PER LA PRESCRIZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE
KENGREXAL(cangrelor)

Indicazioni terapeutiche: Kengrexal, in co-somministrazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la riduzione degli eventi cardiovascolari trombotici nei pazienti adulti con cardiopatia coronarica sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI, percutaneous coronary intervention) che non hanno ricevuto un inibitore orale del recettore P2Y12 prima della procedura di PCI e nei quali la terapia con gli inibitori del recettore P2Y12 per via orale non è fattibile o auspicabile (Vedere RCP al paragrafo 4.1).

Centro Prescrittore			
Medico Prescrittore*			
Telefono*		E-Mail	

Codice fiscale		Cognome nome		
Data nascita		Esenzione		Sesso <input checked="" type="radio"/> Maschio <input type="radio"/> Femmina
Asl Residenza		Residenza		
MMG				

La rimborsabilità è limitata alla soddisfazione di almeno una delle seguenti condizioni:

Paziente che al momento dell'ingresso in sala di emodinamica non ha la ragionevole possibilità di essere trattato per via orale ☐

Paziente per cui sia necessario interrompere rapidamente l'effetto del farmaco per ridurre il rischio emorragico in vista di un intervento cardiocirurgico ☐

Programma Terapeutico

Farmaco	Specialita'	Dose	Durata
KENGREXAL			<input type="checkbox"/> Giorni <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Mesi <input type="text" value="2"/>

La dose raccomandata di Kengrexal per i pazienti sottoposti a PCI è pari a un bolo endovenoso di 30 microgrammi/kg seguito immediatamente da un'infusione endovenosa di 4 microgrammi/kg/minuto. Il bolo e "infusione devono essere iniziati prima della procedura e continuati per almeno due ore o per la durata della procedura, a seconda di quale tempo risulti più lungo. A discrezione del medico, l'infusione può essere continuata per una durata totale di quattro ore.

Data Decorrenza	08/08/2019	Data Termine	08/10/2019
-----------------	------------	--------------	------------