



SCHEDA CARTACEA PER LA PRESCRIZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE
ZERBAXA (CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM)

Indicazioni terapeutiche:Zerbaxa è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti:

- infezione intra-addominali complicate
- pielonefrite acuta
- infezioni complicate del tratto urinario

Devono essere considerate le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici

La rimborsabilità è limitata alla pielonefrite acuta, alle infezioni complicate del tratto urinario sostenute da batteri gram – negativi resistenti ai trattamenti di prima linea e alle infezioni addominali complicate, la cui etiologia documentata o sospetta è dovuta a batteri gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea

Centro Prescrittore

Medico Prescrittore*

Telefono*

E-Mail

* La prescrivibilità è riservata allo specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri (Circolare Ministero dell'Ia Sanità n.52/1985).

Codice fiscale

Cognome nome

Data nascita

Esenzione

Sesso

☒ Maschio ☐ Femmina

Asl Residenza

Residenza

MMG

Diagnosi

Infezione intra-addominale complicata (cIAI) con eziologia documentata/sospetta da batteri Gram-negativi,resistente ai trattamenti di prima linea

☐

Pielonefrite acuta con eziologia documentata da batteri Gram-negativi, resistente ai trattamenti di prima linea (Allegare antibiogramma)

☒

Infezione complicata del tratto urinario (cUTI),includere le pielonefriti, con eziologia documentata da batteri Gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea (Allegare antibiogramma)

☐

Programma Terapeutico

Farmaco	Specialita'	Dose	Durata Prevista
ZERBAXA			<input type="checkbox"/> Giorni <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Mesi <input type="text" value="1"/>

II dosaggio standard in soggetti con CrCl>50 mL/min è 1 g. ceftazidima/0,5 g. tazobactam ogni 8 ore (tempo di infusione: 1 h.) per una durata di 4-14 giorni nel trattamento delle cIAI e di 7 giorni nel trattamento della pielonefrite acuta e delle cUTI.

Data Emissione

22/10/2018

Data Termine

22/11/2018