



S.I.S. :REGIONE PUGLIA

ASL: 160114 - BA

Id. Piano

625221316

SCHEDA CARTACEA PER LA PRESCRIZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE ZERBAXA (CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM)

Indicazioni terapeutiche: Zerbaxa è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti:

- infezione intra-addominali complicate
- pielonefrite acuta
- infezioni complicate del tratto urinario
- Polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP)

Devono essere considerate le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici

La rimborsabilità è limitata alla pielonefrite acuta, alle infezioni complicate del tratto urinario sostenute da batteri gram – negativi resistenti ai trattamenti di prima linea, alle infezioni addominali complicate e alle polmoniti acquisite in ospedale (HAP), incluse le polmoniti associate a ventilazione meccanica (VAP), la cui etiologia documentata o sospetta è dovuta a batteri gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea.

Centro Prescrittore

Medico Prescrittore*

Telefono*

E-Mail

* La prescrivibilità è riservata allo specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri (Circolare Ministero dell'Ia Sanità n.52/1985).

Codice fiscale

Cognome nome

Data nascita

Esenzione

Sesso

☒ Maschio

☐ Femmina

Asl Residenza

Residenza

MMG

Diagnosi

Infezione intra-addominale complicata (cIAI) con eziologia documentata/sospetta* da batteri Gram-negativi, resistente ai trattamenti di prima linea (se si sospetta la presenza di patogeni anaerobi Zerbaxa dovrà essere associato a metronidazolo)

☐

Infezione complicata del tratto urinario (cUTI), inclusa la pielonefrite acuta, con eziologia documentata da batteri Gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea (Allegare antibiogramma)

☐

Polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP), con eziologia documentata/sospetta* da batteri Gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea (da usare in associazione con un agente attivo antibatterico nei confronti di patogeni Gram-positivi, quando questi sono noti o sospetti nel contribuire al processo infettivo)

☒

* L'infezione "sospetta" può essere considerata in pazienti selezionati sulla base di criteri epidemiologici, clinici e microbiologici (ad es. colonizzazione intestinale) in accordo a raccomandazioni terapeutiche definite dal programma di stewardship antibiotica del singolo ospedale.

Programma Terapeutico

Farmaco	Specialita'	Dose	Durata Prevista
ZERBAXA			<input type="checkbox"/> Giorni <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Mesi <input type="text"/>
II dosaggio standard in soggetti con CrCl>50 mL/min è 1 g. ceftazidima/0,5 g. tazobactam ogni 8 ore (tempo di infusione: 1 h.) per una durata di 4-14 giorni nel trattamento delle cIAI e di 7 giorni nel trattamento della pielonefrite acuta e delle cUTI. Nelle HAP/VAP il dosaggio è pari a 2g./1g. Ogni 8 ore (tempo di infusione: 1 h.) per una durata di 8-14 giorni.			
Data Emissione	24/05/2021	Data Termine	24/06/2021