



S.I.S. :REGIONE PUGLIA
ASL: 160114 - BA

PRESCRIZIONE A CARICO DEL SSN DI IPOLIPEMIZZANTI IN
CONFORMITA’ ALLA NOTA AIFA 13

| | | | |
|---------------------|--|--------|--|
| Centro Prescrittore | | | |
| Medico Prescrittore | | | |
| Telefono | | e-mail | |

| | | | |
|-------------------------|--|--------------|--|
| Paziente Codice fiscale | | Cognome nome | |
| Data nascita | | Sesso | <input checked="" type="radio"/> Maschio <input type="radio"/> Femmina |
| Asl Residenza | | Residenza | |

| | |
|---|--|
| ROSUVASTATINA | |
| Trattamento di 1° livello | Trattamento di 2° livello |
| Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno tre mesi / ipercolesterolemia poligenica secondo i criteri specificati dalle Linee Guida ESC/EAS | |
| <input checked="" type="radio"/> Pazienti con rischio molto alto (score >= 10% con evidenza di effetti collaterali severi nei primi 6 mesi di terapia con altre statine | <input type="radio"/> Pazienti con rischio alto (score > 5% < 10%) |
| Dislipidemie familiari | |
| <input type="radio"/> Ipercolesterolemia Familiare Monogenica (FH) | <input checked="" type="radio"/> Iperlipidemia Familiare Combinata <input type="radio"/> Disbetalipoproteinemia |
| EZETIMIBE in monoterapia | |
| Trattamento di 1° livello | Trattamento di 2° livello |
| Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno tre mesi e ipercolesterolemia poligenica secondo i criteri specificati dalle Linee Guida ESC/EAS | |
| Limitatamente ai pazienti che siano intolleranti alle statine, per il conseguimento del target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia | |
| <input type="radio"/> Pazienti con rischio moderato score 4-5% <input type="radio"/> Pazienti con rischio alto score >5% < 10% <input type="radio"/> Pazienti con rischio molto alto score >=10% | <input type="radio"/> Pazienti con rischio medio score 2-3% |
| Iperlipidemie indotte da farmaci non corrette dalla sola dieta secondo i criteri esplicativi | |
| <input type="checkbox"/> Farmaci Immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi In monoterapia per i pazienti che non tollerano il trattamento con statine o non possono eseguirlo | |

| EZETIMIBE in associazione (precostituita o estemporanea) a STATINE | |
|---|--|
| Trattamento di 1° livello | Trattamento di 2° livello |
| Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno tre mesi / ipercolesterolemia poligenica secondo i criteri specificati dalle Linee Guida ESC/EAS | |
| | <div><input type="radio"/> Pazienti con rischio alto (score > 5% < 10%)</div> <div><input type="radio"/> Pazienti con rischio molto alto (score >= 10%)</div> |
| Dislipidemie familiari | |
| | <div><input type="radio"/> Ipercolesterolemia familiare monogenica (FH)</div> <div><input type="radio"/> Iperlipidemia familiare combinata</div> <div><input type="radio"/> Disbetalipoproteinemia</div> |
| Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave | |
| <input type="checkbox"/> Paziente con livelli di LDL-C >= 130mg/dL | |

| Farmaco Prescritto | |
|---|--------------------------|
| Rosuvastatina in monoterapia | |
| <div><input checked="" type="radio"/> Rosuvastatina 5 mg</div> <div><input type="radio"/> Rosuvastatina 10 mg</div> <div><input type="radio"/> Rosuvastatina 20 mg</div> | |
| Ezetimibe in associazione precostituita | |
| <div><input type="radio"/> Ezetimibe+Simvastatina 10 mg/10 mg</div> <div><input type="radio"/> Ezetimibe+Simvastatina 10 mg/20 mg</div> <div><input type="radio"/> Ezetimibe+Simvastatina 10 mg/40 mg</div> | |
| Ezetimibe in monoterapia | |
| <input type="checkbox"/> Ezetimibe 10 mg | |
| Ezetimibe in associazione estemporanea | |
| <input type="checkbox"/> Ezetimibe 10 mg | <div></div> |
| Posologia | <div>una al giorno</div> |
| Data Redazione | <div>28/03/2017</div> |