



SCHEDA CARTACEA PER LA PRESCRIZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE
ZAVICEFTA (CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM)

Indicazioni terapeutiche:Zavicefta è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti:

- infezione intra-addominale complicata (cIAI)
- infezione complicata del tratto urinario (cUTI), inclusa pielonefrite
- polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP)

Zavicefta è inoltre indicato per il trattamento di infezioni causate da microrganismi Gram–negativi aerobi in pazienti adulti nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate

La rimborsabilità è limitata al trattamento delle infezioni urinarie complicate (inclusa la pielonefrite) con documentata resistenza ad un trattamento di prima linea e al trattamento delle infezioni addominali complicate, delle polmoniti nosocomiali (inclusa la VAP), o di altre infezioni in pazienti con opzioni terapeutiche limitate, in cui vi sia sospetto o certezza di infezioni sostenute da batteri gram – negativi aerobi resistenti

Centro Prescrittore

Medico Prescrittore*

Telefono*

E-Mail

* La prescrivibilità è riservata allo specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri (Circolare Ministero dell’Ia Sanità n.52/1985).

Codice fiscale

Cognome nome

Data nascita

Esenzione

Sesso

☒ Maschio ☐ Femmina

Asl Residenza

Residenza

MMG

Diagnosi

Infezione complicata del tratto urinario (cUTI),incluse le pielonefriti, con eziologia documentata da batteri Gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea (Allegare antibiogramma)

☐

Infezione intra-addominale complicata (cIAI) con eziologia documentata/sospetta da batteri Gram-negativi,resistente ai trattamenti di prima linea)

☒

Polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP), con eziologia documentata/sospetta da batteri Gram-negativi, resistente ai trattamenti di prima linea

☐

Infezioni causate da microrganismi Gram-negativi aerobi in pazienti adulti nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate, con eziologia documentata/sospetta da batteri Gram-negativi, resistente ai trattamenti di prima linea

☐

Programma Terapeutico

Farmaco	Specialita'	Dose	Durata Prevista (cfr. RCP)
ZAVICEFTA		2g.ceftazidima/0,5g. Avibactam ogni 8 ore	<input type="checkbox"/> Giorni <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Mesi <input type="text" value="2"/>

II dosaggio standard in soggetti con CrCl>50 mL/min è 2 g. ceftazidima/0,5 g. avibactam ogni 8 ore (tempo di infusione: 2 h.) per una durata di 5-14 giorni nel trattamento delle cIAI, di 5-10 giorni nel trattamento delle cUTI (inclusa la pielonefrite acuta) e di 7-14 giorni per le polmoniti acquisite in ospedale (incluse le VAP). Vi è esperienza molto limitata per un utilizzo superiore a 14 giorni.

Data Emissione

26/04/2018

Data Termine

26/06/2018