

**CONSENSO INFORMATO PER ESAME TC/RX CON MDC**  
**Ospedale F. Ferrari - Casarano U.O. di Radiologia - *Primario FF: Dr. P. Spagnolo***

*N. Tel 0833 508357 (orari 12-13 e 17-19) - 0832 508212 /segreteria) FAX 0833508358*

*Da esibire al momento dell'esame*

Durante l'esame RX e TC richiesto dal suo medico, è possibile/previsto che le venga somministrato un mezzo di contrasto contenente iodio, che renderà l'esame maggiormente diagnostico; il Radiologo deciderà se utilizzarlo in rapporto alla situazione clinica ed anche considerando il rapporto rischio/beneficio.. Sebbene tale farmaco sia molto sicuro, può però dare occasionalmente delle reazioni imprevedibili, indipendentemente dalla dose, dall'abilità e dall'esperienza del medico che conduce l'esame che, generalmente, sono trattate con terapia medica, nelle forme "minori" (1% dei pazienti) e nelle severe (0,017% dei pazienti). Eventuali pretrattamenti farmacologici possono ridurre questi rischi, ma non prevenirli del tutto.

La invitiamo a presentarsi in TC o in Radiologia

- a digiuno (ultimo pasto 6/8 ore prima dell'esame)
- a non allontanarsi per almeno ½ ora dopo l'esecuzione dell'esame
- a bere circa 1-2 litri di acqua nel corso della giornata e nei due giorni successivi.

NB: LE DONNE IN ETA' FERTILE CHE DEVONO SOTTOPORSI ALL'ESAME TC/RX DEVONO AVERE L'ASSOLUTA CERTEZZA DI NON ESSERE IN GRAVIDANZA.

DA COMPILARE DA PARTE DEL MEDICO RICHIEDENTE: in conformità alle note del ministero della Sanità del 17/09/1997 sulla utilizzazione del mdc è necessario conoscere le condizioni ed alcune particolari elementi clinico-anamnestici del suo paziente.

Dichiaro che il paziente .....ricoverato c/o.....

indagine proposta .....quesito clinico..... HA

Comprovato rischio allergico	SI	NO	Insufficienza epatica, renale, cardiovascolare	SI	NO
Disparaproteinemie, Mieloma Multiplo	SI	NO	Ipertiroidismo	SI	NO
Assunzione di beta bloccanti, Biguanidi (Metformina), Interleukina 2				SI	NO

Specificare..... e può perciò sottoporsi all'esame TC/RX con mdc.

Firma e timbro del medico richiedente.....; solo nel caso in cui il medico richiedente non conosca le attuali condizioni cliniche del paziente, per un più completo inquadramento, è consigliabile faccia effettuare gli esami di Elettroforesi proteica con tracciato, Azotemia, Creatininemia, FT3, FT4, TSE, Urine, ECG.

GLI ESAMI SONO VALIDI 30 GIORNI PRIMA DELL'ESAME.

DA COMPILARE DA PARTE DEL PAZIENTE: Il paziente legga attentamente il seguente modulo di consenso all'esecuzione all'esame e lo firmi davanti al Radiologo esecutore, a cui può chiedere chiarimenti.

DICHIARO

- di essere stata/o informata/o esaurientemente ed in modo comprensibile sull'indicazione clinica, l'utilità, le modalità di realizzazione dell'esame TC da eseguire, e sull'uso e gli effetti collaterali e secondari (reazioni avverse inattese) dovuti al mezzo di contrasto
- di aver ricevuto risposta alle domande poste al medico.

Esprimo il mio consenso alla esecuzione dell'esame TC

IN FEDE

Firma paziente (o esercitante patria potestà) .....

Firma Radiologo ..... Casarano, il .....

**CONSENSO INFORMATO PER ESAME TC/RX CON MDC**  
**Ospedale F. Ferrari - Casarano U.O. di Radiologia - *Primario FF: Dr. P. Spagnolo***  
*N. Tel 0833 508357 (orari 12-13 e 17-19) - 0832 508212 /segreteria) FAX 0833508358*  
***Da esibire al momento dell'esame***

Preparazione antiallergica TC - RM ospedale Casarano

Consigliamo, in pazienti con riferita allergia a sostanze, a medicinali ed a mezzi di contrasto iodato o paramagnetico, un trattamento farmacologico preparatorio all'esame radiologico, che prevede l'uso di mdc per via endovenosa, allo scopo di ridurre o prevenire reazioni allergiche secondo lo schema successivo.

PREDNISONE (Deltacortene forte o generici)	2 cp da 25 mg ogni 6 ore, iniziando da 18 ore prima dell'esame
BILASTINA ( Robilas o generici)	1 cp da 20 mg 1 ora prima dell'esame
OMEPRAZOLO (o similari)	2 cp da 20 mg 3 ore prima dell'esame

NOTA: E' importante che il paziente si interfacci, qualche giorno prima dell'esame, con il radiologo per poter valutare la probabilità o la necessità di effettuare la somministrazione di mdc e, quindi, di iniziare la terapia.

Si consiglia abbondante idratazione del paziente prima e dopo l'esame, per accelerare l'eliminazione del mdc per via renale, soprattutto nei casi di insufficienza renale ed epatica.

La preparazione resta intesa come sopra, salvo diverso parere del medico curante.