

Garantire sempre la disponibilità di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani

Vestizione Operatore:

1. togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;
2. controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;
3. indossare un primo paio di guanti;
4. indossare sopra la divisa il camice monouso;
5. indossare idoneo filtrante facciale;
6. indossare gli occhiali di protezione;
7. indossare un copricapo;
8. indossare secondo paio di guanti.

Svestizione Operatore:

La procedura deve avvenire appena giunti in postazione

Regole comportamentali:

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
- i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore presente nell'area di svestizione;
- decontaminare i DPI riutilizzabili;
- rispettare la sequenza indicata:
 1. rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;
 2. rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
 3. rimuovere il copricapo
 4. rimuovere gli occhiali e sanificarli;
 5. rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;
 6. rimuovere il secondo paio di guanti;
 7. praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

| Mezzo di soccorso o mezzi di trasporto | | | |
|---|---|--|---|
| Contesto attività | Chi | Azione | Tipologia di DPI o misure di protezione |
| Mezzo di soccorso o mezzi di trasporto | Operatori sanitari | Trasporto sospetto caso COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento | <ul style="list-style-type: none"> Mascherina chirurgica Camice monouso idrorepellente Guanti Occhiali / occhiali a maschera/occhiali di protezione/ occhiale a mascherina/visiera |
| | Autista mezzo | SE Solo guida del mezzo con sospetto caso di COVID-19 a bordo e separazione del posto di guida da quello del paziente | <ul style="list-style-type: none"> Mantenere la distanza di almeno 1 metro Non sono necessari DPI |
| | | SE Assistenza nelle fasi di carico e scarico del paziente sospetto per COVID-19 | <ul style="list-style-type: none"> Mascherina chirurgica Camice monouso idrorepellente Guanti Occhiali/occhiali a maschera/occhiali di protezione/ occhiale a mascherina/visiera |
| | | Nessun contatto diretto con paziente sospetto per COVID-19 ma senza separazione del posto di guida da quello del paziente | <ul style="list-style-type: none"> Mascherina chirurgica |
| | Paziente con sospetta infezione da COVID-19 | Trasporto alla struttura sanitaria di riferimento | <ul style="list-style-type: none"> Mascherina chirurgica se tollerata |
| | Operatori 118 addetti alle pulizie | Pulizie dopo e durante il trasporto dei pazienti con sospetta infezione da COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento | <ul style="list-style-type: none"> Mascherina chirurgica Camice monouso idrorepellente Guanti spessi Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche) Stivali o scarpe da lavoro chiuse |

SANIFICAZIONE ABITACOLO AMBULANZA

Di seguito la descrizione della sequenza delle attività attuate dall'equipaggio (infermiere/autista soccorritore), relative alla sanificazione e sanitizzazione dell'abitacolo sanitario e vano guida al termine dell'intervento su un caso sospetto di COVID-19:

- Pannetti monouso, erogatore con prodotto disinfettante/detergente tipo MELSEPT da utilizzare con doppio passaggio.
- smaltimento di biancheria e rifiuti come pericolosi a rischio infettivo
- spruzzare la soluzione sulla barella strofinando ogni sua parte con panno monouso,
- utilizzare nuovo panno ed eseguire l'operazione su pareti, soffitto, arredi e pavimento.
- Ripetere il tutto con nuovo passaggio e nuovi pannetti
- smaltire i pannetti nei rifiuti pericolosi a rischio infettivo
- igienizzare le mani dopo la rimozione dei guanti
- areare l'abitacolo per 15 minuti
- In caso di superfici visibilmente contaminate da sostanze organiche (sangue, urine, feci, vomito ecc.) l'operatore, indossando sempre i DPI, deve procedere alla decontaminazione da effettuarsi nel seguente modo:
 - ✓ versare o spruzzare disinfettante sul materiale organico e lasciare agire per 15 minuti
 - ✓ asportare il materiale con panno monouso
 - ✓ smaltire il panno nell'apposito contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo
 - ✓ procedere alla sanificazione e sanitizzazione con la tecnica sopradescritta.

RICONDIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI

Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro:

- Devono sempre essere preferiti dispositivi monouso che devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
- Strumentazioni quali sfigmomanometro, saturimetro, fonendoscopio etc. devono essere dedicate esclusivamente al paziente con COVID-19 e ricondizionate prima dell'uso su un altro paziente.
- I dispositivi che vanno ricondizionati devono essere trattati con eventuale decontaminazione, detersione e disinfezione/sterilizzazione nel rispetto dei documenti aziendali vigenti. Il prodotto da utilizzare per la disinfezione, ove richiesta, è il cloroderivato al 10%,
- Le operazioni di trattamento dei dispositivi devono essere svolte indossando i DPI previsti per l'assistenza al paziente

RICONDIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RIUTILIZZABILI (occhiali, schermo facciale)

- Porre il dispositivo all'interno di un sacchetto a perdere, chiuderlo bene e trasportarlo nella zona di ripristino materiali; qualora il dispositivo sia utilizzato al domicilio, trasportarlo nella zona di ripristino materiali presso la U.O. di appartenenza.
- Predisporre una vaschetta con detergente enzimatico lasciandolo in immersione per 10 minuti
- Detergere manualmente il dispositivo, in ogni sua parte, con un pannello monouso.
- Risciacquare sotto acqua corrente
- Asciugare il dispositivo con pannello monouso

Rif:

Servizio Sanitario Emilia Romagna;

Manuale per operatori dei mezzi di Soccorso – Regione Marche

Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni - Agg. 14 Marzo 2020

Gestione Operativa evento sospetto COVID-19 in Centrale Operativa

Allertamento per paziente che riferisce sintomi suggestivi di infezione da Coronavirus

Dispatch

Localizzazione esatta:

Generalità:

Età:

Telefono:

Sintomatologia: **Ricorda: febbre (87,9%), tosse secca (67,7%), -respiro corto (18,6%), presenza di patologie concomitanti.**

Criterio epidemiologico:

- Contatto stretto con persone con documentata positività
- Contatto con persona in isolamento fiduciario
- A quanto tempo risale il contatto . _____


Decisione: _____

PAZIENTE DA NON OSPEDALIZZARE

Se la sintomatologia lo consente l'operatore, eventualmente supportato dal Medico di C.O. invita l'utente a:

- o non lasciare il proprio domicilio
- o contattare il Medico di Medicina di Generale che provvederà a segnalare al Dipartimento di Prevenzione per attuare una sorveglianza sanitaria.

PAZIENTE DA OSPEDALIZZARE



-VALUTARE, ne caso in cui la richiesta proviene dal Medico Curante:

Paziente automunito? Si consiglia accompagnamento tramite familiare con mezzo proprio;

La Centrale Operativa preavvisa il P.S. di destinazione affinché si prepari ad accogliere il paziente

-Se non automunito, segui procedura di cui sopra

-In ogni caso, quando si allerta mezzo 118 si danno ad equipaggio tutte le notizie raccolte e indicazioni per uso DPI

Gestione Operativa evento sospetto COVID-19 sul territorio

Allertamento mezzo ASL e/o 118: Massima cura nel precisare tutti i fattori di rischio per il personale

Raccomandazioni da impartire:

1. Il paziente viene visitato solo dal Team leader, protetto con DPI idonei (VEDI TABELLE PRECEDENTI)
2. IL team leader verifica che quanto appurato in dispatch sia reale
In caso di assenza di reale compromissione respiratoria e parametri vitali nella norma, si procede a ri- segnalare il paziente al Medico curante, che continuerà a seguirlo in isolamento domiciliare.
3. In caso di grave sintomatologia respiratoria che conferma il sospetto di polmonite da COVID-19 e che necessita di ospedalizzazione, si provvede al trasporto con le modalità descritte di seguito a seconda del mezzo intervenuto
 - a) **Mezzo intervenuto INDIA.**
 - a1) **Effettua valutazione** : Il paziente viene valutato solo dal Team leader protetto.
 - a2) ritiene di avere necessità della valutazione medica? Ne fa richiesta alla Centrale Operativa, resta unico ad indossare i DPI.
 - a3) ritiene di non avere necessità della valutazione medica?
Chiede alla Centrale Operativa la destinazione, dispone agli altri membri di procedere a vestizione dei DPI, fa indossare mascherina al paziente, collega fonte di Ossigeno, appena pronti si procede trasporto.
 - a4) la Centrale Operativa allerta il presidio di riferimento
 - b) **Mezzo intervenuto MIKE.**
 - b1) **Effettua valutazione** : Il paziente viene valutato solo dal Medico, protetto.
 - b2) Medico chiede alla Centrale Operativa la destinazione, dispone agli altri membri di procedere a vestizione dei DPI, fa indossare mascherina al paziente, collega fonte di Ossigeno , stabilizza se necessario e appena pronti si procede trasporto.
 - b3) la Centrale Operativa allerta il presidio di riferimento
 - c) **Mezzo primo intervenuto AUTOMEDICA**
 - c1) **Effettua valutazione** : Il paziente viene valutato solo dal Medico, protetto.
 - c2) Medico chiede alla Centrale Operativa invio di ambulanza ASL, resta unico ad indossare i DPI. Appena arriva ambulanza dispone ad un infermiere di procedere a vestizione dei DPI, fa indossare mascherina al paziente, collega fonte di Ossigeno, stabilizza se necessario e appena pronti si procede trasporto. Nel vano sanitario salgono esclusivamente medico e infermieri protetti.
*
 - c3) Medico* chiede alla Centrale Operativa la destinazione, fa indossare mascherina al paziente, collega fonte di Ossigeno , stabilizza se necessario e appena pronti si procede trasporto.
 - c4) la Centrale Operativa allerta il presidio di riferimento

*In caso di necessità si avvale di altro operatore anche questo protetto.

il trasporto viene effettuato da ambulanza con a bordo solo gli operatori che hanno già indossato i DPI per il primo approccio. Il personale in esubero verrà trasferito su altro mezzo, al fine di salvaguardare operatori sanitari e i DPI in dotazione.

Il personale protetto con i DPI, con gli stessi indossati, rientra in postazione e, solo lì, si sveste e poi si procede a bonifica del mezzo di soccorso (VEDI TABELLE PRECEDENTI).